

- vol. 6, p. 538. NOUV. DUFAMEL, vol. 7, p. 47, et *Tab.* 11, fig. 2. *Non* RAU  
*Enum. Ros.* p. 90.  
 R. (*Canina*) var.  $\beta$ . DC. Fl. franc. 3716. POIR. Ency. 6, 288, var.  $\beta$ . Vulg. *Rosier*  
*des haies à fl. roses*. Sous-variété à fleurs semi-doubles.  
 $\beta$ . R. *Septium parviflora*. BAST. Suppl. p. 31. Petit arbrisseau qui ne s'élève guères qu'à  
 un pied et demi. Environs d'Angers. Vulg. *Rosier des haies à petites fleurs*.  
 $\gamma$ . R. *Septium alba*. DESV. l. c. p. 116, var.  $\alpha$ .  
 R. (*Agrestis*). GM. Bad. 2, p. 416. SAVI, Fl. Pis. 1, p. 475. Les folioles sont plus  
 arrondies que dans les autres variétés. Vulg. *Rosier des haies à fl. blanches*.  
 $\delta$ . R. *Septium myrtifolia*. (N.)  
 R. (*Myrtifolia*). HALLER FIL. R. (*Canina myrtifolia*). Du P. *Gymn. Ros.* 1, n° 6, in THY.  
 R. CAYR., p. 13. Folioles petites, elliptiques très-luisantes en-dessus, assez sem-  
 blables aux feuilles du myrte. Fleurs d'un blanc-lavé-de-rose, souvent solitaires.  
 Vulg. *Rosier des haies à feuilles de myrte*.  
 $\epsilon$ . R. *Septium olei-carpa*. (N.)  
 R. *Olei-carpa*. TH. inédit. Trouvée aux environs de Paris par M. THUILLIER, qui a  
 bien voulu nous la communiquer. C'est une variété remarquable par les nervures  
 très-saillantes des folioles, et ses fruits qui offrent la forme exacte d'une olive  
 moyenne. Vulg. *Rosier des haies à fruits d'olivier*.  
 $\zeta$ . R. *Septium ambigua*. DESV. l. c. p. 116. Les pédoncules sont quelquefois un peu  
 hispides dans cette variété. Vulg. *Rosier des haies équivoque*.  
 $\eta$ . R. *Septium latifolia, foliolis magnis, remotis, grandi-dentatis, basi acutis, apice sub-*  
*rotundis; floribus exalbo-roseis; cyma trifida*. (N.)  
 Folioles, trois ou quatre fois plus grandes que dans la précédente; chaque paire,  
 très-écartée l'une de l'autre, se développe sur un pétiole souvent long de quatre  
 pouces. Cette variété nous a été envoyée par M. LE GRAND, qui l'a découverte  
 sur la lisière de la forêt de Chantilly, à Saint-Firmin, aux environs de l'habitation  
 de M. LECOSTE. Vulg. *Rosier des haies à grandes feuilles*.

Les Rosiers de cette série sont communs dans toute la France. Quelques auteurs ont  
 prétendu que le *Rosa Septium* n'était qu'une modification du *Rosa Rubiginosa*; cependant  
 celui-ci s'en éloigne par ses tiges moins élancées, par ses folioles presque rondes, un peu  
 pubescentes en-dessus, et couvertes en-dessous, comme sur les bordures de glandes vis-  
 queuses, entremêlées de poils, souvent, couleur de rouille; mais, sur-tout, par la forte  
 odeur de pomme de reinette que donnent ces mêmes folioles froissées dans les doigts, ca-  
 ractère propre à tous les Rosiers du groupe des *Rubiginosæ*, et qu'on ne trouve pas dans  
 celui des *Septienæ*.